



Bystrzyca Kłodzka, dnia 02 listopada 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KŁODZKU

Z SIEDZIBĄ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

**Panie i Panowie
Burmistrzowie i Wójtowie
powiatu kłodzkiego**

Nasz znak:

PIWz 4012.02.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej w związku z istniejącym zagrożeniem ponownego wystąpienia grypy ptaków na terenie Polski oraz konieczności wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu, prosi o przekazanie informacji hodowcom drobiu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 722), którego przepisy muszą być przestrzegane przez wszystkich posiadaczy drobiu.

Do pisma dołącza się ulotkę - „INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU”.

Link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii z informacjami na temat grypy ptaków :

<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow>


Z poważaniem

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kłodzku
lek. wet. Grzegorz Chmielowski



Uwaga! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ
W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA
PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)



INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce

**hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność
i stosować odpowiednie środki bioasekuracji
minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków
do gospodarstwa, w szczególności:**

- 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni,
pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;**
- 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych
lub pod szczelnym przykryciem,
uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych,
do których nie mają dostępu ptaki dzikie;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne
oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami
umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.**

Hodowco!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji
(lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,
wójt/burmistrz/prezydent miasta)
podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody;
objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów;
duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności